



Infección de los conductos mamarios

Ductal Infection

¿Qué es una infección de los conductos mamarios?

Basándonos en sus síntomas y en el examen físico, le hemos diagnosticado infección de los conductos mamarios. Algunas madres tienen una infección que lentamente va creciendo en los senos y que causa dolor sin tener fiebre. Estas infecciones que crecen lentamente no son peligrosas para el bebé por lo que puede seguir amamantando sin ningún problema.

Tratamiento para la infección de los conductos

Para tratar esta infección, le hemos recetado un antibiótico. Por favor termine las pastillas recetadas incluso si mejora el dolor antes de que las termine. Puede tomar este medicamento sin ningún problema mientras da el pecho.

¿Qué medicamentos para el dolor puedo tomar mientras doy el pecho al bebé?

Para aliviar el dolor, puede tomar acetaminophen (Tylenol) 650-1000 mg cada 4 a 6 horas (pero no más de 4000 mg –u 8 pastillas «extra-strength»– al día) o ibuprofeno (Motrin) 400-600 mg cada 6 horas.

Cuándo comenzará a sentirse mejor

Las infecciones de los conductos tardan mucho en mejorarse. Si continua teniendo dolor después de 7 o 10 días o si tiene más preocupaciones, por favor llame a la línea de ayuda para la lactancia al 984-974-8078 o al (866) 428-5608.